SCDS på Hook 250410

Niklas Danckwardt-Lilliesström
Luca Verrecchia
Andreas Kaiser


Patient
Mottagare
Utredning
Behandling
Resultat
1 mån
2-3 mån
Remiss ULP välutredd
DT
KEH
Gemensam bedömning
Baseline
Operation
tel
Baseline uppföljnin
Remiss ULP
KEH
DT
Baseline
Gemensa m mott
Operation
tel
Baseline uppföljning
Remiss regionalt
ON H
H&B
DT
Baseline
Gemensam mott
Operation
Konservativ behandling
Återbesök
Baseline uppföljning
Kaiser 2025

DT-undersökning som vägledning inför kirurgi

Tillräcklig kvalitet
- Storlek på dehiscens
- Placering
- Åtkomlighet
  - Duraöverhäng
  - Encefalocele

Rekonstruktion
- Stenvers
- Pöschl

Planerad metod

- Täckning
- Pluggning







Dura-överhäng

Bra att värdera åtkomstmöjlighet enl DT





Stenvers projektion



Pöschl projektion



3D-rekonstruktion

Kortikalt ”lock”

Försök att förhindra postoperativa symtom från mastoiden (på förekommen anledning)



Pluggning 1











Täckning













Peroperativa ordinationer

Kortison

- 4 mg Betapred extra peroperativt, + nedtrappningsschema (totalt 10 dagar)

Antibiotika

- Peroperativt 1 g Cefotaxim

Hyperkapné

- Till 4.0 kPa (temporärt)

Mannitol

- 150 mg/ml, 300 ml på 20 minuter